

## RAZZA MODENESE

I dati espressi nelle seguenti tabelle sono frutto della raccolta di informazioni sulle caratterizzazioni fenotipiche effettuate durante l'intera durata del Progetto DualBreeding Fase 1 e sua successiva Fase 2, ancora in fase di svolgimento.

La presente statistica si basa su 446 osservazioni delle quali 306 sono state rilevate durante la Fase1 del Progetto DualBreeding.

**Tabella 1.** Ripartizione dei soggetti relativamente ai caratteri distribuzione del mantello, colore del mantello e portamento delle corna

Colore mantello	N°	%	Mantello distrib.	N°	%	Corna	N°	%
Bianco	431	96.6	Intero	407	91.3	Assenti	140	31.4
Grigio	9	2.0	Pezzato	9	2.0	Portate in alto	82	18.4
Nero	0	0	Spruzzato	30	6.7	Portate in avanti	99	22.2
Bruno Chiaro	0	0	Striscia Dorsale	0	0	Rivolte in basso	13	2.9
Bruno Scuro	0	0				Decornato	112	25.1
Castano	4	0.9						
Fromentino	1	0.2						
Rosso	1	0.2						
Rosso Mogano	0	0						

**Tabella 2.** Statistiche descrittive delle variabili oggetto di caratterizzazione fenotipica

	N°	Media	Ds	Min.	Max.
Altezza al sacro (cm)	446	138.7	6.3	110	170
Profondità addominale (cm)	446	74.0	10.8	55	100
Lunghezza tronco (cm)	446	95.2	8.2	70	112
Lunghezza groppa (cm)	446	46.0	5.9	30	74
Larghezza groppa bisiliaca (cm)	446	49.7	4.4	32	70
Larghezza groppa bischiatica (cm)	446	24.5	5.3	15	40
Inclinazione groppa (punteggio)	446	4.6	1.2	2	8
Prof. mammaria (cm)	446	6.8	6.7	-40	30
Lunghezza capezzoli anteriori (cm)	446	6.1	1.4	2	10
BCS (punteggio)	446	3.6	0.3	2.5	4.5
Muscolosità anteriore (punteggio)	446	6.7	0.9	4	9
Muscolosità Posteriore (punteggio)	446	6.7	1.3	3	9

Aprile 2024

**Tabella 3.** Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la struttura degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Dorso Insellato	392	87.9	43	9.6	11	2.5
Dorso Arcuato	445	99.8	1	0.2	0	0.0
Spalle Deboli	414	92.8	17	3.8	15	3.4
Garretti serrati posteriormente	373	83.6	60	13.5	13	2.9
Unghia aperta	395	88.6	39	8.7	12	2.7

**Tabella 4.** Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la mammella degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Capezzoli a imbuto	350	78.5	67	15.0	29	6.5
Capezzoli non perpendicolari	368	82.5	74	16.6	4	0.9
Capezzoli soprannumerari	361	80.9	54	12.1	31	7.0
Mammella spaccata tra i quarti	329	73.8	82	18.4	35	7.8
Piano inclinato	344	77.1	87	19.5	15	3.4

**Tabella 5.** Ripartizione dei soggetti in relazione al temperamento verso i conspecifici, l'uomo e in mungitura

	Non osservabile		Tranquillo		Nervoso	
	N°	%	N°	%	N°	%
Verso gli altri animali	85	19.1	356	79.8	5	1.1
Durante la mungitura	99	22.2	340	76.2	7	1.6
Verso l'uomo	85	19.1	332	74.4	29	6.5