

RAZZA MODICANA

I dati espressi nelle seguenti tabelle sono frutto della raccolta di informazioni sulle caratterizzazioni fenotipiche effettuate durante l'intera durata del Progetto DualBreeding Fase 1 e sua successiva Fase 2, ancora in fase di svolgimento.

La presente statistica si basa su 1533 osservazioni delle quali 876 sono state rilevate durante la Fase1 del Progetto DualBreeding.

Tabella 1. Ripartizione dei soggetti relativamente ai caratteri distribuzione del mantello, colore del mantello e portamento delle corna

Colore mantello	N°	%	Mantello distrib.	N°	%	Corna	N°	%
Bianco	0	0	Intero	1458	95.1	Assenti	50	3.3
Grigio	0	0	Pezzato	6	0.4	Portate in alto	1103	71.9
Nero	23	1.5	Spruzzato	0	0	Portate in avanti	202	13.2
Bruno Chiaro	5	0.3	Striscia Dorsale	69	4.5	Rivolte in basso	20	1.3
Bruno Scuro	3	0.2				Decornato	158	10.3
Castano	17	1.1						
Fromentino	201	13.1						
Rosso	908	59.2						
Rosso Mogano	376	24.5						

Tabella 2. Statistiche descrittive delle variabili oggetto di caratterizzazione fenotipica

	N°	Media	Ds	Min.	Max.
Altezza al sacro (cm)	1533	149.4	8.5	130	170
Profondità addominale (cm)	1533	76.9	7.6	56	110
Lunghezza tronco (cm)	1533	81.9	6.1	70	110
Lunghezza groppa (cm)	1533	46.2	5.8	33	67
Larghezza groppa bisiliaca (cm)	1533	47.2	4.6	33	63
Larghezza groppa bischiatica (cm)	1533	25.8	6.2	10	39
Inclinazione groppa (punteggio)	1533	6.5	1.1	1	9
Prof. mammaria (cm)	1533	12.7	7.3	-15	40
Lunghezza capezzoli anteriori (cm)	1533	9.6	3.1	3	25
BCS (punteggio)	1533	2.8	0.4	1.75	4.5
Muscolosità anteriore (punteggio)	1533	3.1	1.2	1	9
Muscolosità Posteriore (punteggio)	1533	3.1	1.3	1	9

Aprile 2024

Tabella 3. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la struttura degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Dorso Insellato	804	52.4	634	41.4	95	6.2
Dorso Arcuato	1494	97.5	39	2.5	0	0.0
Spalle Deboli	1051	68.6	453	29.5	29	1.9
Garretti serrati posteriormente	1186	77.4	299	19.5	48	3.1
Unghia aperta	1116	72.8	347	22.6	70	4.6

Tabella 4. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la mammella degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Capezzoli a imbuto	1114	72.7	308	20.1	111	7.2
Capezzoli non perpendicolari	1313	86.6	208	13.6	12	0.8
Capezzoli soprannumerari	946	61.7	496	32.4	91	5.9
Mammella spaccata tra i quarti	876	57.1	596	38.9	61	4.0
Piano inclinato	863	56.3	547	35.7	123	8.0

Tabella 5. Ripartizione dei soggetti in relazione al temperamento verso i conspecifici, l'uomo e in mungitura

	Non osservabile		Tranquillo		Nervoso	
	N°	%	N°	%	N°	%
Verso gli altri animali	1027	67.0	499	32.5	7	0.5
Durante la mungitura	1035	67.5	483	31.5	15	1.0
Verso l'uomo	934	60.9	539	35.2	6	3.9