

RAZZA VARZESE

I dati espressi nelle seguenti tabelle sono frutto della raccolta di informazioni sulle caratterizzazioni fenotipiche effettuate durante l'intera durata del Progetto DualBreeding Fase 1 e sua successiva Fase 2, ancora in fase di svolgimento.

La presente statistica si basa su 52 osservazioni delle quali 36 sono state rilevate durante la Fase1 del Progetto DualBreeding.

Tabella 1. Ripartizione dei soggetti relativamente ai caratteri distribuzione del mantello, colore del mantello e portamento delle corna

Colore mantello	N°	%	Mantello distrib.	N°	%	Corna	N°	%
Bianco	0	0	Intero	52	100.0	Assenti	8	15.4
Grigio	0	0	Pezzato	0	0	Portate in alto	31	59.6
Nero	0	0	Spruzzato	0	0	Portate in avanti	10	19.2
Bruno Chiaro	0	0	Striscia Dorsale	0	0	Rivolte in basso	2	3.9
Bruno Scuro	0	0				Decornato	1	1.9
Castano	0	0						
Fromentino	52	100.0						
Rosso	0	0						
Rosso Mogano	0	0						

Tabella 2. Statistiche descrittive delle variabili oggetto di caratterizzazione fenotipica

	N°	Media	Ds	Min.	Max.
Altezza al sacro (cm)	52	135.0	4.4	123	147
Profondità addominale (cm)	52	83.7	10.9	68	103
Lunghezza tronco (cm)	52	92.5	6.4	80	110
Lunghezza groppa (cm)	52	53.3	3.5	47	60
Larghezza groppa bisiliaca (cm)	52	49.9	4.6	41	60
Larghezza groppa bisischiatica (cm)	52	19.9	1.7	16	24
Inclinazione groppa (punteggio)	52	4.7	1.1	2	7
Prof. mammaria (cm)	52	14.3	5.4	3	32
Lunghezza capezzoli anteriori (cm)	52	8.2	1.8	5	12
BCS (punteggio)	52	2.9	0.5	2	4.25
Muscolosità anteriore (punteggio)	52	4.9	1.2	2	7
Muscolosità Posteriore (punteggio)	52	4.9	1.2	2	7

Aprile 2024

Tabella 3. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la struttura degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Dorso Insellato	39	75.0	13	25.0	0	0.0
Dorso Arcuato	51	98.1	1	1.9	0	0.0
Spalle Deboli	39	75.0	13	25.0	0	0.0
Garretti serrati posteriormente	43	82.7	8	15.4	1	1.9
Unghia aperta	47	90.4	5	9.6	0	0.0

Tabella 4. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la mammella degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Capezzoli a imbuto	35	67.3	14	26.9	3	5.8
Capezzoli non perpendicolari	52	100.0	0	0.0	0	0.0
Capezzoli soprannumerari	35	67.3	17	32.7	0	0.0
Mammella spaccata tra i quarti	37	71.1	15	28.8	0	0.0
Piano inclinato	39	75.0	9	17.3	4	7.7

Tabella 5. Ripartizione dei soggetti in relazione al temperamento verso i conspecifici, l'uomo e in mungitura

	Non osservabile		Tranquillo		Nervoso	
	N°	%	N°	%	N°	%
Verso gli altri animali	46	88.5	5	9.6	1	1.9
Durante la mungitura	41	78.9	11	21.1	0	0.0
Verso l'uomo	32	61.5	19	36.5	1	1.9