

## RAZZA PEZZATA ROSSA D'OROPA

I dati espressi nelle seguenti tabelle sono frutto della raccolta di informazioni sulle caratterizzazioni fenotipiche effettuate durante l'intera durata del Progetto DualBreeding Fase 1 e sua successiva Fase 2, ancora in fase di svolgimento.

La presente statistica si basa su 2161 osservazioni delle quali 907 sono state rilevate durante la Fase1 del Progetto DualBreeding.

**Tabella 1.** Ripartizione dei soggetti relativamente ai caratteri distribuzione del mantello, colore del mantello e portamento delle corna

Colore mantello	N°	%	Mantello distrib.	N°	%	Corna	N°	%
Bianco	102	4.7	Intero	1549	71.7	Assenti	3	0.1
Grigio	0	0	Pezzato	603	27.9	Portate in alto	1903	88.1
Nero	387	17.9	Spruzzato	9	0.4	Portate in avanti	237	11.0
Bruno Chiaro	3	0.1	Striscia Dorsale	0	0	Rivolte in basso	18	0.8
Bruno Scuro	4	0.2				Decornato	0	0
Castano	0	0						
Fromentino	114	6.7						
Rosso	1421	65.8						
Rosso Mogano	100	4.6						

**Tabella 2.** Statistiche descrittive delle variabili oggetto di caratterizzazione fenotipica

	N°	Media	Ds	Min.	Max.
Altezza al sacro (cm)	2161	141.7	4.5	125	158
Profondità addominale (cm)	2161	79.7	5.2	60	105
Lunghezza tronco (cm)	2161	99.2	5.9	71	120
Lunghezza groppa (cm)	2161	48.2	3.5	35	69
Larghezza groppa bisiliaca (cm)	2161	46.7	3.7	32	63
Larghezza groppa bisischiatica (cm)	2161	31.8	3.5	22	40
Inclinazione groppa (punteggio)	2161	5.8	0.8	3	9
Prof. mammaria (cm)	2161	7.0	3.4	-9	20
Lunghezza capezzoli anteriori (cm)	2161	7.5	2.1	3	17
BCS (punteggio)	2161	3.5	0.5	1.25	5
Muscolosità anteriore (punteggio)	2161	5.1	1.3	2	9
Muscolosità Posteriore (punteggio)	2161	4.9	1.4	1	9

Febbraio 2024

**Tabella 3.** Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la struttura degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Dorso Insellato	1980	91.6	171	7.9	10	0.5
Dorso Arcuato	1696	91.1	189	8.8	3	0.1
Spalle Deboli	1899	87.9	255	11.8	7	0.3
Garretti serrati posteriormente	1596	73.8	533	24.6	32	1.5
Unghia aperta	1783	82.5	365	16.9	13	0.6

**Tabella 4.** Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la mammella degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Capezzoli a imbuto	1668	77.2	454	21.0	39	1.8
Capezzoli non perpendicolari	1735	80.3	356	16.5	70	3.2
Capezzoli soprannumerari	1299	60.1	836	38.7	26	1.2
Mammella spaccata tra i quarti	1796	83.1	344	15.9	21	1.0
Piano inclinato	1696	78.5	438	20.3	27	1.2

**Tabella 5.** Ripartizione dei soggetti in relazione al temperamento verso i conspecifici, l'uomo e in mungitura

	Non osservabile		Tranquillo		Nervoso	
	N°	%	N°	%	N°	%
Verso gli altri animali	629	29.1	1496	68.0	63	2.9
Durante la mungitura	903	41.8	1144	52.9	114	5.3
Verso l'uomo	593	27.4	1486	68.8	82	3.8