

RAZZA PUSTERTALER - BARA'

I dati espressi nelle seguenti tabelle sono frutto della raccolta di informazioni sulle caratterizzazioni fenotipiche effettuate durante l'intera durata del Progetto DualBreeding Fase 1 e sua successiva Fase 2, ancora in fase di svolgimento.

La presente statistica si basa su 973 osservazioni delle quali 567 sono state rilevate durante la Fase1 del Progetto DualBreeding.

Tabella 1. Ripartizione dei soggetti relativamente ai caratteri distribuzione del mantello, colore del mantello e portamento delle corna

Colore mantello	N°	%	Mantello distrib.	N°	%	Corna	N°	%
Bianco	3	0.3	Intero	3	0.3	Assenti	2	0.2
Grigio	0	0	Pezzato	59	6.1	Portate in alto	400	41.1
Nero	903	92.8	Spruzzato	531	54.6	Portate in avanti	502	51.6
Bruno Chiaro	0	0	Striscia Dorsale	380	39.0	Rivolte in basso	50	5.1
Bruno Scuro	0	0				Decornato	19	1.9
Castano	0	0						
Fromentino	0	0						
Rosso	67	6.9						
Rosso Mogano	0	0						

Tabella 2. Statistiche descrittive delle variabili oggetto di caratterizzazione fenotipica

	N°	Media	Ds	Min.	Max.
Altezza al sacro (cm)	973	140.5	5.2	121	154
Profondità addominale (cm)	973	78.5	6.2	60	106
Lunghezza tronco (cm)	973	85.7	5.9	70	113
Lunghezza groppa (cm)	973	48.1	4.4	38	62
Larghezza groppa bisiliaca (cm)	973	49.0	5.8	35	75
Larghezza groppa bisischiatica (cm)	973	21.2	2.2	12	37
Inclinazione groppa (punteggio)	973	5.2	1.1	2	9
Prof. mammaria (cm)	973	-3.6	9.8	-23	35
Lunghezza capezzoli anteriori (cm)	973	7.6	2.2	3	20
BCS (punteggio)	973	3.3	0.6	1	5
Muscolosità anteriore (punteggio)	973	6.0	1.2	1	9
Muscolosità Posteriore (punteggio)	973	6.4	1.2	1	9

Febbraio 2024

Tabella 3. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la struttura degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Dorso Insellato	755	77.6	182	18.7	36	3.7
Dorso Arcuato	951	97.7	19	2.0	3	0.3
Spalle Deboli	735	75.5	216	22.2	22	2.3
Garretti serrati posteriormente	710	73.0	230	23.6	33	3.4
Unghia aperta	810	83.2	157	16.1	6	0.6

Tabella 4. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la mammella degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Capezzoli a imbuto	541	55.6	370	38.0	62	6.4
Capezzoli non perpendicolari	634	65.2	317	32.6	22	2.3
Capezzoli soprannumerari	562	57.8	311	32.0	100	10.3
Mammella spaccata tra i quarti	490	50.4	384	39.4	99	10.2
Piano inclinato	387	39.8	500	51.4	86	8.8

Tabella 5. Ripartizione dei soggetti in relazione al temperamento verso i conspecifici, l'uomo e in mungitura

	Non osservabile		Tranquillo		Nervoso	
	N°	%	N°	%	N°	%
Verso gli altri animali	280	28.8	451	46.3	242	24.9
Durante la mungitura	390	40.1	550	56.5	33	3.4
Verso l'uomo	314	32.3	537	55.2	122	12.5