

RAZZA AGEROLESE

I dati espressi nelle seguenti tabelle sono frutto della raccolta di informazioni sulle caratterizzazioni fenotipiche effettuate durante l'intera durata del Progetto DualBreeding Fase 1 e sua successiva Fase 2, ancora in fase di svolgimento.

La presente statistica si basa su 36 osservazioni delle quali 36 sono state rilevate durante la Fase I del Progetto DualBreeding.

Tabella 1. Ripartizione dei soggetti relativamente ai caratteri distribuzione del mantello, colore del mantello e portamento delle corna

Colore mantello	N°	%	Mantello distrib.	N°	%	Corna	N°	%
Bianco	0	0	Intero	5	13.9	Assenti	0	0
Grigio	0	0	Pezzato	0	0	Portate in alto	2	5.6
Nero	0	0	Spruzzato	0	0	Portate in avanti	28	77.8
Bruno Chiaro	4	11.1	Striscia Dorsale	31	86.1	Rivolte in basso	3	8.3
Bruno Scuro	31	86.1				Decorato	3	8.3
Castano	1	2.8						
Fromentino	0	0						
Rosso	0	0						
Rosso Mogano	0	0						

Tabella 2. Statistiche descrittive delle variabili oggetto di caratterizzazione fenotipica

Altezza al sacro (cm)	36	147.8	4.6	138	154
Profondità addominale (cm)	36	97.3	7	68	110
Lunghezza tronco (cm)	36	100.6	3.4	94	108
Lunghezza groppa (cm)	36	49.5	5.9	36	69
Larghezza groppa bisiliaca (cm)	36	45.8	3.1	40	52
Larghezza groppa bisischiatica (cm)	36	35.9	3.1	28	40
Inclinazione groppa (punteggio)	36	5.3	0.6	4	6
Prof. mammaria (cm)	36	5.3	0.9	4	7
Lunghezza capezzoli anteriori (cm)	36	5.5	0.9	4	7
BCS (punteggio)	36	2.5	1.1	1	4
Muscolosità anteriore (punteggio)	36	5.8	1	3	7
Muscolosità Posteriore (punteggio)	36	6.3	0.9	4	8

Tabella 3. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la struttura degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Dorso Insellato	34	94.4	2	5.56	0	0
Dorso Arcuato	36	100	0	0	0	0
Spalle Deboli	36	100	0	0	0	0
Garretti serrati posteriormente	26	72.2	10	27.8	0	0
Unghia aperta	25	69.4	11	30.6	0	0

Tabella 4. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la mammella degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Capezzoli a imbuto	17	47.2	19	52.8	0	0
Capezzoli non perpendicolari	11	30.6	25	69.4	0	0
Capezzoli soprannumerari	13	36.1	23	63.9	0	0
Mammella spaccata tra i quarti	17	47.2	19	52.8	0	0
Piano inclinato	26	72.2	10	27.8	0	0

Tabella 5. Ripartizione dei soggetti in relazione al temperamento verso i conspecifici, l'uomo e in mungitura

	Non osservabile		Tranquillo		Nervoso	
	N°	%	N°	%	N°	%
Verso gli altri animali	26	72.2	10	27.8	0	0
Durante la mungitura	25	69.4	11	30.6	0	0
Verso l'uomo	27	75	9	25	0	0