

RAZZA BURLINA

I dati espressi nelle seguenti tabelle sono frutto della raccolta di informazioni sulle caratterizzazioni fenotipiche effettuate durante l'intera durata del Progetto DualBreeding Fase 1 e sua successiva Fase 2, ancora in fase di svolgimento.

La presente statistica si basa su 353 osservazioni delle quali 353 sono state rilevate durante la Fase 1 del Progetto DualBreeding.

Tabella 1. Ripartizione dei soggetti relativamente ai caratteri distribuzione del mantello, colore del mantello e portamento delle corna

Colore mantello	N°	%	Mantello distrib.	N°	%	Corna	N°	%
Bianco	0	0	Intero	1	0.3	Assenti	1	0.3
Grigio	0	0	Pezzato	350	99.1	Portate in alto	46	13.0
Nero	351	99.4	Spruzzato	2	0.6	Portate in avanti	111	31.4
Bruno Chiaro	0	0	Striscia Dorsale	0	0	Rivolte in basso	6	1.7
Bruno Scuro	0	0				Decorato	189	53.5
Castano	0	0						
Fromentino	0	0						
Rosso	0	0						
Rosso Mogano	2	0.6						

Tabella 2. Statistiche descrittive delle variabili oggetto di caratterizzazione fenotipica

	N°	Media	Ds	Min.	Max.
Altezza al sacro (cm)	353	133.8	6.7	113	158
Profondità addominale (cm)	353	89.1	9.4	63	117
Lunghezza tronco (cm)	353	94.0	7.2	70	118
Lunghezza groppa (cm)	353	51.0	3.9	40	65
Larghezza groppa bisiliaca (cm)	353	51.7	4.1	40	73
Larghezza groppa bisischiatica (cm)	353	25.2	4.6	15	37
Inclinazione groppa (punteggio)	353	4.4	1.3	1	9
Prof. mammaria (cm)	353	9.6	8.5	-15	37
Lunghezza capezzoli anteriori (cm)	353	6.7	2.5	1	17
BCS (punteggio)	353	3.5	0.4	2.25	4.5
Muscolosità anteriore (punteggio)	353	5.0	1.5	2	9
Muscolosità Posteriore (punteggio)	353	5.5	1.3	3	8

Tabella 3. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la struttura degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Dorso Insellato	342	96.9	11	3.1	0	0
Dorso Arcuato	336	95.2	17	4.8	0	0
Spalle Deboli	323	91.5	29	8.2	1	0.3

Garretti serrati posteriormente	333	94.3	19	5.4	1	0.3
Unghia aperta	333	94.3	20	5.7	0	0

Tabella 4. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la mammella degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Capezzoli a imbuto	345	97.7	7	2.0	1	0.3
Capezzoli non perpendicolari	307	87.0	42	11.9	4	1.1
Capezzoli soprannumerari	300	85.0	44	12.5	9	2.5
Mammella spaccata tra i quarti	330	93.5	22	6.2	1	0.3
Piano inclinato	268	75.2	75	21.3	10	2.8

Tabella 5. Ripartizione dei soggetti in relazione al temperamento verso i conspecifici, l'uomo e in mungitura

	Non osservabile		Tranquillo		Nervoso	
	N°	%	N°	%	N°	%
Verso gli altri animali	79	22.4	266	75.4	8	2.3
Durante la mungitura	79	22.4	261	73.9	13	3.7
Verso l'uomo	78	22.1	265	75.1	10	2.8