

RAZZA CINISARA

I dati espressi nelle seguenti tabelle sono frutto della raccolta di informazioni sulle caratterizzazioni fenotipiche effettuate durante l'intera durata del Progetto DualBreeding Fase 1 e sua successiva Fase 2, ancora in fase di svolgimento.

La presente statistica si basa su 1166 osservazioni delle quali 864 sono state rilevate durante la Fase 1 del Progetto DualBreeding.

Tabella 1. Ripartizione dei soggetti relativamente ai caratteri distribuzione del mantello, colore del mantello e portamento delle corna

Colore mantello	N°	%	Mantello distrib.	N°	%	Corna	N°	%
Bianco	0	0	Intero	1156	99.1	Assenti	9	0.8
Grigio	1	0.1	Pezzato	6	0.5	Portate in alto	1087	93.2
Nero	1165	99.9	Spruzzato	0	0	Portate in avanti	68	5.8
Bruno Chiaro	0	0	Striscia Dorsale	4	0.3	Rivolte in basso	1	0.1
Bruno Scuro	0	0				Decorato	1	0.1
Castano	0	0						
Fromentino	0	0						
Rosso	0	0						
Rosso Mogano	0	0						

Tabella 2. Statistiche descrittive delle variabili oggetto di caratterizzazione fenotipica

	N°	Media	Ds	Min.	Max.
Altezza al sacro (cm)	1166	142.4	4.4	125	160
Profondità addominale (cm)	1166	70.2	4.9	57	92
Lunghezza tronco (cm)	1166	76.4	3.7	70	89
Lunghezza groppa (cm)	1166	43.5	2.8	32	74
Larghezza groppa bisiliaca (cm)	1166	45.2	2.9	30	60
Larghezza groppa bisischiatica (cm)	1166	28.5	2.2	22	39
Inclinazione groppa (punteggio)	1166	7.0	0.7	4	9
Prof. mammaria (cm)	1166	13.6	4.1	-6	40
Lunghezza capezzoli anteriori (cm)	1166	7.6	1.6	4	15
BCS (punteggio)	1166	2.5	0.3	1.25	3.75
Muscolosità anteriore (punteggio)	1166	2.9	1.5	2	8
Muscolosità Posteriore (punteggio)	1166	3.0	1.6	1	8

Tabella 3. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la struttura degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Dorso Insellato	668	57.3	494	42.4	4	0.3
Dorso Arcuato	1117	95.8	49	4.2	0	0
Spalle Deboli	945	81.1	214	18.3	7	0.6

Progetto DUALBREEDING – Caratterizzazione Fenotipica
Marzo 2022



Garretti serrati posteriormente	1095	93.9	71	6.1	0	0
Unghia aperta	1007	86.4	156	13.4	3	0.3

Tabella 4. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la mammella degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Capezzoli a imbuto	1010	86.6	153	13.1	3	0.3
Capezzoli non perpendicolari	1105	94.8	59	5.1	2	0.2
Capezzoli soprannumerari	731	62.7	401	34.4	34	2.3
Mammella spaccata tra i quarti	911	78.1	254	21.8	1	0.1
Piano inclinato	645	55.3	476	40.8	45	3.8

Tabella 5. Ripartizione dei soggetti in relazione al temperamento verso i conspecifici, l'uomo e in mungitura

	Non osservabile		Tranquillo		Nervoso	
	N°	%	N°	%	N°	%
Verso gli altri animali	1132	97.1	34	2.9	0	0
Durante la mungitura	1050	90.1	101	8.7	15	1.3
Verso l'uomo	1028	88.2	127	10.9	11	0.9