

RAZZA GARFAGNINA

I dati espressi nelle seguenti tabelle sono frutto della raccolta di informazioni sulle caratterizzazioni fenotipiche effettuate durante l'intera durata del Progetto DualBreeding Fase 1 e sua successiva Fase 2, ancora in fase di svolgimento.

La presente statistica si basa su 50 osservazioni delle quali 50 sono state rilevate durante la Fase I del Progetto DualBreeding.

Tabella 1. Ripartizione dei soggetti relativamente ai caratteri distribuzione del mantello, colore del mantello e portamento delle corna

Colore mantello	N°	%	Mantello distrib.	N°	%	Corna	N°	%
Bianco	0	0	Intero	36	72	Assenti	0	0
Grigio	24	48	Pezzato	0	0	Portate in alto	19	38
Nero	1	2	Spruzzato	0	0	Portate in avanti	28	56
Bruno Chiaro	10	20	Striscia Dorsale	14	28	Rivolte in basso	3	6
Bruno Scuro	14	28				Decornato	0	0
Castano	1	2						
Fromentino	0	0						
Rosso	0	0						
Rosso Mogano	0	0						

Tabella 2. Statistiche descrittive delle variabili oggetto di caratterizzazione fenotipica

	N°	Media	Ds	Min.	Max.
Altezza al sacro (cm)	50	142.7	12.0	120	165
Profondità addominale (cm)	50	71.2	10.8	55	90
Lunghezza tronco (cm)	50	78.0	8.8	70	100
Lunghezza groppa (cm)	50	48.0	8.1	32	60
Larghezza groppa bisiliaca (cm)	50	42.3	7.1	30	55
Larghezza groppa bisischiatica (cm)	50	27.2	6.6	10	37
Inclinazione groppa (punteggio)	50	4.4	1.0	2	6
Prof. mammaria (cm)	50	23.6	7.3	16	40
Lunghezza capezzoli anteriori (cm)	50	9.6	3.0	4	18
BCS (punteggio)	50	3.4	0.8	2	5
Muscolosità anteriore (punteggio)	50	4.4	1.5	2	9
Muscolosità Posteriore (punteggio)	50	4.2	1.4	2	8

Tabella 3. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la struttura degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Dorso Insellato	36	72	13	26	1	2
Dorso Arcuato	45	90	5	10	0	0
Spalle Deboli	40	80	10	20	0	0

Garretti serrati posteriormente	46	92	4	8	0	0
Unghia aperta	50	100	0	0	0	0

Tabella 4. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la mammella degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Capezzoli a imbuto	50	100	0	0	0	0
Capezzoli non perpendicolari	44	88	6	12	0	0
Capezzoli soprannumerari	50	100	0	0	0	0
Mammella spaccata tra i quarti	48	96	2	4	0	0
Piano inclinato	47	94	3	6	0	0

Tabella 5. Ripartizione dei soggetti in relazione al temperamento verso i conspecifici, l'uomo e in mungitura

	Non osservabile		Tranquillo		Nervoso	
	N°	%	N°	%	N°	%
Verso gli altri animali	7	14	8	16	35	70
Durante la mungitura	50	100	0	0	0	0
Verso l'uomo	5	10	10	20	35	70