

RAZZA MODENESE

I dati espressi nelle seguenti tabelle sono frutto della raccolta di informazioni sulle caratterizzazioni fenotipiche effettuate durante l'intera durata del Progetto DualBreeding Fase 1 e sua successiva Fase 2, ancora in fase di svolgimento.

La presente statistica si basa su 341 osservazioni delle quali 304 sono state rilevate durante la Fase 1 del Progetto DualBreeding.

Tabella 1. Ripartizione dei soggetti relativamente ai caratteri distribuzione del mantello, colore del mantello e portamento delle corna

Colore mantello	N°	%	Mantello distrib.	N°	%	Corna	N°	%
Bianco	329	96.5	Intero	314	92.1	Assenti	103	30.2
Grigio	7	2.1	Pezzato	8	2.4	Portate in alto	61	17.9
Nero	0	0	Spruzzato	19	5.6	Portate in avanti	83	24.3
Bruno Chiaro	0	0	Striscia Dorsale	0	0	Rivolte in basso	6	1.7
Bruno Scuro	0	0				Decorato	88	25.8
Castano	4	1.2						
Fromentino	0	0						
Rosso	1	0.3						
Rosso Mogano	0	0						

Tabella 2. Statistiche descrittive delle variabili oggetto di caratterizzazione fenotipica

	N°	Media	Ds	Min.	Max.
Altezza al sacro (cm)	341	138.4	6.5	125	170
Profondità addominale (cm)	341	73.3	11.5	55	100
Lunghezza tronco (cm)	341	95.3	8.8	70	110
Lunghezza groppa (cm)	341	48.0	4.4	30	74
Larghezza groppa bisiliaca (cm)	341	50.0	4.2	38	70
Larghezza groppa bisischiatica (cm)	341	25.9	5.2	16	40
Inclinazione groppa (punteggio)	341	4.4	1.1	2	8
Prof. mammaria (cm)	341	6.5	7.3	-40	30
Lunghezza capezzoli anteriori (cm)	341	6.1	1.5	2	10
BCS (punteggio)	341	3.6	0.3	2.5	4.5
Muscolosità anteriore (punteggio)	341	7.0	0.8	4	9
Muscolosità Posteriore (punteggio)	341	7.1	1.1	3	9

Tabella 3. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la struttura degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Dorso Insellato	293	85.9	37	10.8	11	3.2
Dorso Arcuato	340	99.7	0	0	1	0.3
Spalle Deboli	315	92.4	11	3.3	15	4.4

Garretti serrati posteriormente	285	83.6	43	12.6	13	3.8
Unghia aperta	310	90.9	19	5.6	12	3.5

Tabella 4. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la mammella degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Capezzoli a imbuto	272	79.8	41	12	28	8.2
Capezzoli non perpendicolari	290	85	47	13.8	4	1.2
Capezzoli soprannumerari	289	84.8	31	9.1	21	6.1
Mammella spaccata tra i quarti	247	72.4	60	17.6	34	9.9
Piano inclinato	260	76.2	66	19.3	15	4.4

Tabella 5. Ripartizione dei soggetti in relazione al temperamento verso i conspecifici, l'uomo e in mungitura

	Non osservabile		Tranquillo		Nervoso	
	N°	%	N°	%	N°	%
Verso gli altri animali	82	24.1	254	74.5	5	1.5
Durante la mungitura	87	25.5	247	72.4	7	2.1
Verso l'uomo	82	24.1	237	69.5	22	6.5