

RAZZA MODICANA

I dati espressi nelle seguenti tabelle sono frutto della raccolta di informazioni sulle caratterizzazioni fenotipiche effettuate durante l'intera durata del Progetto DualBreeding Fase 1 e sua successiva Fase 2, ancora in fase di svolgimento.

La presente statistica si basa su 1020 osservazioni delle quali 876 sono state rilevate durante la Fase 1 del Progetto DualBreeding.

Tabella 1. Ripartizione dei soggetti relativamente ai caratteri distribuzione del mantello, colore del mantello e portamento delle corna

Colore mantello	N°	%	Mantello distrib.	N°	%	Corna	N°	%
Bianco	0	0	Intero	950	93.1	Assenti	48	4.7
Grigio	0	0	Pezzato	6	0.6	Portate in alto	690	67.7
Nero	11	1.1	Spruzzato	0	0	Portate in avanti	182	17.8
Bruno Chiaro	5	0.5	Striscia Dorsale	64	6.3	Rivolte in basso	20	1.9
Bruno Scuro	2	0.2				Decorato	80	7.8
Castano	16	1.6						
Fromentino	121	11.9						
Rosso	684	67.1						
Rosso Mogano	181	17.8						

Tabella 2. Statistiche descrittive delle variabili oggetto di caratterizzazione fenotipica

	N°	Media	Ds	Min.	Max.
Altezza al sacro (cm)	1020	149.7	7.9	130	170
Profondità addominale (cm)	1020	78.6	6.7	56	95
Lunghezza tronco (cm)	1020	82.7	6.4	70	110
Lunghezza groppa (cm)	1020	46.8	4.0	37	60
Larghezza groppa bisiliaca (cm)	1020	46.2	4.0	33	60
Larghezza groppa bisischiatica (cm)	1020	24.9	5.7	10	39
Inclinazione groppa (punteggio)	1020	6.4	1.1	1	9
Prof. mammaria (cm)	1020	10.5	7.0	-15	40
Lunghezza capezzoli anteriori (cm)	1020	9.5	3.6	3	25
BCS (punteggio)	1020	2.7	0.3	2	4.25
Muscolosità anteriore (punteggio)	1020	3.1	1.3	2	8
Muscolosità Posteriore (punteggio)	1020	3.2	1.3	2	8

Tabella 3. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la struttura degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Dorso Insellato	507	49.7	427	41.9	86	8.4
Dorso Arcuato	988	96.9	32	3.1	0	0
Spalle Deboli	636	62.4	362	35.5	22	2.2

Garretti serrati posteriormente	734	72.0	254	24.9	32	3.1
Unghia aperta	661	64.8	289	28.3	70	6.9

Tabella 4. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la mammella degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Capezzoli a imbuto	634	62.2	275	27	111	10.9
Capezzoli non perpendicolari	822	80.6	186	18.4	12	1.2
Capezzoli soprannumerari	673	66	290	28.4	57	5.6
Mammella spaccata tra i quarti	455	44.6	508	49.8	57	5.6
Piano inclinato	481	47.2	430	42.2	109	10.6

Tabella 5. Ripartizione dei soggetti in relazione al temperamento verso i conspecifici, l'uomo e in mungitura

	Non osservabile		Tranquillo		Nervoso	
	N°	%	N°	%	N°	%
Verso gli altri animali	634	62.2	381	37.4	5	0.5
Durante la mungitura	669	65.6	342	33.5	9	0.9
Verso l'uomo	618	60.6	369	36.2	33	3.2