

## RAZZA PUSTERTALER

I dati espressi nelle seguenti tabelle sono frutto della raccolta di informazioni sulle caratterizzazioni fenotipiche effettuate durante l'intera durata del Progetto DualBreeding Fase 1 e sua successiva Fase 2, ancora in fase di svolgimento.

La presente statistica si basa su 773 osservazioni delle quali 567 sono state rilevate durante la Fase 1 del Progetto DualBreeding.

**Tabella 1.** Ripartizione dei soggetti relativamente ai caratteri distribuzione del mantello, colore del mantello e portamento delle corna

Colore mantello	N°	%	Mantello distrib.	N°	%	Corna	N°	%
Bianco	3	0.4	Intero	2	0.3	Assenti	2	0.2
Grigio	0	0	Pezzato	59	7.6	Portate in alto	353	45.7
Nero	707	91.5	Spruzzato	451	58.3	Portate in avanti	350	45.3
Bruno Chiaro	0	0	Striscia Dorsale	261	33.8	Rivolte in basso	49	6.3
Bruno Scuro	0	0				Decorato	19	2.5
Castano	0	0						
Fromentino	0	0						
Rosso	63	8.1						
Rosso Mogano	0	0						

**Tabella 2.** Statistiche descrittive delle variabili oggetto di caratterizzazione fenotipica

	N°	Media	Ds	Min.	Max.
Altezza al sacro (cm)	773	140.0	5.6	121	154
Profondità addominale (cm)	773	78.6	6.7	60	106
Lunghezza tronco (cm)	773	85.6	6.3	70	113
Lunghezza groppa (cm)	773	48.1	4.8	38	62
Larghezza groppa bisiliaca (cm)	773	48.9	6.4	35	75
Larghezza groppa bisischiatica (cm)	773	21.2	2.4	12	37
Inclinazione groppa (punteggio)	773	5.1	1.2	2	9
Prof. mammaria (cm)	773	-3.4	10.6	-23	35
Lunghezza capezzoli anteriori (cm)	773	7.5	2.3	3	20
BCS (punteggio)	773	3.3	0.6	1	5
Muscolosità anteriore (punteggio)	773	5.9	1.3	1	9
Muscolosità Posteriore (punteggio)	773	6.3	1.3	1	9

**Tabella 3.** Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la struttura degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Dorso Insellato	570	73.7	168	21.7	35	4.6
Dorso Arcuato	752	97.3	18	2.3	3	0.4
Spalle Deboli	560	72.5	192	24.8	21	2.7
Garretti serrati posteriormente	526	68	214	27.7	33	4.3

Unghia aperta	637	82.4	130	16.8	6	0.8
---------------	-----	------	-----	------	---	-----

**Tabella 4.** Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la mammella degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Capezzoli a imbuto	456	59	266	34.4	51	6.6
Capezzoli non perpendicolari	565	73.1	200	25.9	8	1
Capezzoli soprannumerari	468	60.5	210	27.2	95	12.3
Mammella spaccata tra i quarti	408	52.8	273	35.3	92	11.9
Piano inclinato	360	46.6	353	45.7	60	7.7

**Tabella 5.** Ripartizione dei soggetti in relazione al temperamento verso i conspecifici, l'uomo e in mungitura

	Non osservabile		Tranquillo		Nervoso	
	N°	%	N°	%	N°	%
<b>Verso gli altri animali</b>	276	35.7	363	47	134	17.3
<b>Durante la mungitura</b>	340	44	402	52	31	4
<b>Verso l'uomo</b>	257	33.3	403	52.1	113	14.6