

RAZZA VARZESE

I dati espressi nelle seguenti tabelle sono frutto della raccolta di informazioni sulle caratterizzazioni fenotipiche effettuate durante l'intera durata del Progetto DualBreeding Fase 1 e sua successiva Fase 2, ancora in fase di svolgimento.

La presente statistica si basa su 36 osservazioni delle quali 36 sono state rilevate durante la Fase I del Progetto DualBreeding.

Tabella 1. Ripartizione dei soggetti relativamente ai caratteri distribuzione del mantello, colore del mantello e portamento delle corna

Colore mantello	N°	%	Mantello distrib.	N°	%	Corna	N°	%
Bianco	0	0	Intero	36	100	Assenti	0	0
Grigio	0	0	Pezzato	0	0	Portate in alto	23	63.9
Nero	0	0	Spruzzato	0	0	Portate in avanti	10	27.8
Bruno Chiaro	0	0	Striscia Dorsale	0	0	Rivolte in basso	2	5.6
Bruno Scuro	0	0				Decorato	1	2.8
Castano	0	0						
Fromentino	36	100						
Rosso	0	0						
Rosso Mogano	0	0						

Tabella 2. Statistiche descrittive delle variabili oggetto di caratterizzazione fenotipica

	N°	Media	Ds	Min.	Max.
Altezza al sacro (cm)	36	135.3	4.4	127	147
Profondità addominale (cm)	36	77.2	5.1	68	88
Lunghezza tronco (cm)	36	92.9	6.8	80	110
Lunghezza groppa (cm)	36	53.7	3.4	47	60
Larghezza groppa bisiliaca (cm)	36	48.8	4.9	41	60
Larghezza groppa bisischiatica (cm)	36	19.6	1.7	16	24
Inclinazione groppa (punteggio)	36	4.9	1.0	3	7
Prof. mammaria (cm)	36	12.9	4.2	3	24
Lunghezza capezzoli anteriori (cm)	36	8.0	1.6	5	12
BCS (punteggio)	36	2.7	0.4	2	4
Muscolosità anteriore (punteggio)	36	4.9	1.3	2	7
Muscolosità Posteriore (punteggio)	36	4.9	1.3	2	7

Tabella 3. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la struttura degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Dorso Insellato	26	72.2	10	27.8	0	0
Dorso Arcuato	35	97.2	1	2.8	0	0
Spalle Deboli	25	68.4	11	30.6	0	0
Garretti serrati posteriormente	30	83.3	5	13.9	1	2.8

Unghia aperta	32	88.9	4	11.1	0	0
---------------	----	------	---	------	---	---

Tabella 4. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la mammella degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Capezzoli a imbuto	26	72.2	9	25.0	1	2.8
Capezzoli non perpendicolari	36	100	0	0	0	0
Capezzoli soprannumerari	22	61.1	14	38.9	0	0
Mammella spaccata tra i quarti	25	69.4	11	30.6	0	0
Piano inclinato	28	77.8	7	19.4	1	2.8

Tabella 5. Ripartizione dei soggetti in relazione al temperamento verso i conspecifici, l'uomo e in mungitura

	Non osservabile		Tranquillo		Nervoso	
	N°	%	N°	%	N°	%
Verso gli altri animali	34	94.4	2	5.6	0	0
Durante la mungitura	34	94.4	2	5.6	0	0
Verso l'uomo	32	88.9	4	11.1	0	0