

RAZZA MODENESE

I dati espressi nelle seguenti tabelle sono frutto della raccolta di informazioni sulle caratterizzazioni fenotipiche effettuate durante l'intera durata del Progetto DualBreeding Fase 1 e sua successiva Fase 2, ancora in fase di svolgimento.

La presente statistica si basa su 394 osservazioni delle quali 304 sono state rilevate durante la Fase1 del Progetto DualBreeding.

Tabella 1. Ripartizione dei soggetti relativamente ai caratteri distribuzione del mantello, colore del mantello e portamento delle corna

Colore mantello	N°	%	Mantello distrib.	N°	%	Corna	N°	%
Bianco	379	96.1	Intero	355	90.1	Assenti	114	28.9
Grigio	9	2.2	Pezzato	9	2.3	Portate in alto	66	16.7
Nero	0	0	Spruzzato	30	7.6	Portate in avanti	91	23.1
Bruno Chiaro	0	0	Striscia Dorsale	0	0	Rivolte in basso	11	2.8
Bruno Scuro	0	0				Decornato	112	28.4
Castano	4	1.0						
Fromentino	1	0.2						
Rosso	1	0.2						
Rosso Mogano	0	0						

Tabella 2. Statistiche descrittive delle variabili oggetto di caratterizzazione fenotipica

	N°	Media	Ds	Min.	Max.
Altezza al sacro (cm)	394	138.6	6.4	110	170
Profondità addominale (cm)	394	74.1	11.2	55	100
Lunghezza tronco (cm)	394	95.2	8.4	70	110
Lunghezza groppa (cm)	394	47.2	5.0	30	74
Larghezza groppa bisiliaca (cm)	394	49.7	4.3	32	70
Larghezza groppa bisischiatica (cm)	394	25.2	5.2	16	40
Inclinazione groppa (punteggio)	394	4.5	1.2	2	8
Prof. mammaria (cm)	394	6.5	7.0	-40	30
Lunghezza capezzoli anteriori (cm)	394	6.1	1.4	2	10
BCS (punteggio)	394	3.6	0.3	2.5	4.5
Muscolosità anteriore (punteggio)	394	6.8	0.9	4	9
Muscolosità Posteriore (punteggio)	394	6.9	1.2	3	9

Marzo 2023

Tabella 3. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la struttura degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Dorso Insellato	344	87.3	39	9.9	11	2.8
Dorso Arcuato	393	99.8	1	0.3	0	0.0
Spalle Deboli	366	92.9	13	3.3	15	3.8
Garretti serrati posteriormente	335	85.0	46	11.7	13	3.3
Unghia aperta	360	91.4	22	5.6	12	3.1

Tabella 4. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la mammella degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Capezzoli a imbuto	306	77.7	60	15.2	28	7.1
Capezzoli non perpendicolari	330	83.8	60	15.2	4	1.0
Capezzoli soprannumerari	325	82.5	44	11.2	25	6.4
Mammella spaccata tra i quarti	290	73.6	70	17.8	34	8.6
Piano inclinato	304	77.2	75	19.0	15	3.8

Tabella 5. Ripartizione dei soggetti in relazione al temperamento verso i conspecifici, l'uomo e in mungitura

	Non osservabile		Tranquillo		Nervoso	
	N°	%	N°	%	N°	%
Verso gli altri animali	82	20.8	307	77.9	5	1.3
Durante la mungitura	96	24.4	291	73.9	7	1.8
Verso l'uomo	82	20.8	287	72.8	25	6.4