

RAZZA PINZGAUER

I dati espressi nelle seguenti tabelle sono frutto della raccolta di informazioni sulle caratterizzazioni fenotipiche effettuate durante l'intera durata del Progetto DualBreeding Fase 1 e sua successiva Fase 2, ancora in fase di svolgimento.

La presente statistica si basa su 1.097 osservazioni delle quali 791 sono state rilevate durante la Fase1 del Progetto DualBreeding.

Tabella 1. Ripartizione dei soggetti relativamente ai caratteri distribuzione del mantello, colore del mantello e portamento delle corna

Colore mantello	N°	%	Mantello distrib.	N°	%	Corna	N°	%
Bianco	32	2.9	Intero	18	1.8	Assenti	453	41.3
Grigio	0	0	Pezzato	17	1.7	Portate in alto	202	18.4
Nero	4	0.4	Spruzzato	14	1.4	Portate in avanti	170	15.5
Bruno Chiaro	2	0.2	Striscia Dorsale	966	95.2	Rivolte in basso	34	3.1
Bruno Scuro	5	0.5				Decornato	238	21.7
Castano	0	0						
Fromentino	142	12.9						
Rosso	1	0.1						
Rosso Mogano	34	3.1						

Tabella 2. Statistiche descrittive delle variabili oggetto di caratterizzazione fenotipica

	N°	Media	Ds	Min.	Max.
Altezza al sacro (cm)	1097	141.5	5.6	120	170
Profondità addominale (cm)	1097	87.7	5.3	70	101
Lunghezza tronco (cm)	1097	92.5	6.0	75	110
Lunghezza groppa (cm)	1097	54.4	3.2	45	68
Larghezza groppa bisiliaca (cm)	1097	55.6	4.0	45	70
Larghezza groppa bisischiatica (cm)	1097	21.5	4.3	13	40
Inclinazione groppa (punteggio)	1097	4.8	1.3	1	9
Prof. mammaria (cm)	1097	13.4	8.5	-16	35
Lunghezza capezzoli anteriori (cm)	1097	6.2	1.8	1	15
BCS (punteggio)	1097	3.3	0.5	1	5
Muscolosità anteriore (punteggio)	1097	3.6	1.2	1	8
Muscolosità Posteriore (punteggio)	1097	4.1	1.2	1	8

Marzo 2023

Tabella 3. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la struttura degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Dorso Insellato	933	85.0	130	11.9	34	3.1
Dorso Arcuato	990	90.2	99	9.0	8	0.7
Spalle Deboli	899	81.9	159	14.5	39	3.6
Garretti serrati posteriormente	940	85.7	122	11.1	35	3.2
Unghia aperta	1068	97.4	25	2.3	4	0.4

Tabella 4. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la mammella degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Capezzoli a imbuto	999	91.1	78	7.1	20	1.8
Capezzoli non perpendicolari	1046	95.4	42	3.8	9	0.8
Capezzoli soprannumerari	1035	95.4	51	4.6	11	1.0
Mammella spaccata tra i quarti	992	90.4	92	8.4	13	1.2
Piano inclinato	979	88.2	90	8.2	28	2.6

Tabella 5. Ripartizione dei soggetti in relazione al temperamento verso i conspecifici, l'uomo e in mungitura

	Non osservabile		Tranquillo		Nervoso	
	N°	%	N°	%	N°	%
Verso gli altri animali	126	79.2	31	19.5	2	1.3
Durante la mungitura	704	64.2	312	28.4	81	7.4
Verso l'uomo	119	74.8	37	23.3	3	1.9